

БОРИС СКАЧКО

**ТРОМБОЦИТОПЕНІЯ:
ЯК ПІДНЯТИ ТРОМБОЦИТИ?**

25 РОКІВ ДОСВІДУ ЛІКАРЯ СКАЧКО



Б.Г. Скачко

Тромбоцитопенія: як підняти тромбоцити?

25 років досвіду лікаря Скачко

Низькі тромбоцити у крові? Впали тромбоцити? Як підняти тромбоцити? Як вилікувати тромбоцитопенію?

Такі питання на консультації ставлять часто.

Коли я починав лікування тромбоцитопенії, вона називалася хвороба Верльгофа, ідіопатична тромбоцитопенія, ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура, ІТП. На той час також була відома симптоматична тромбоцитопенія.

Нині ця хвороба більш відома як імунна тромбоцитопенія.

Не суттєво, під якою назвою вам відоме це захворювання. Мій спосіб лікування тромбоцитопенії з часом став тільки досконалішим. І дозволяє у більшості вилікувати тромбоцитопенію без ускладнень.

25 років досвіду лікування тромбоцитопенії натуральними засобами в домашніх умовах лікаря-фітотерапевта Скачко Бориса містить ця корисна книга.

Це друге видання, перероблене (45) та доповнене.

Зміст

Пролог

Як з'явився метод лікування тромбоцитопенії?

Як виникла ідея розпочати лікування тромбоцитопенії натуральними засобами?

Лікування ІТП натуральними засобами: перші результати!

Чому і коли виникає тромбоцитопенія?

Що таке тромбоцитопенія чи хвороба Верльгофа?

Навіщо вам потрібні тромбоцити?

Види тромбоцитопенії

Однак тромбоцитопенія центрального походження може бути і внаслідок прямої токсичної дії (27) на кістковий мозок. Це можуть бути препарати з цитотоксичною активністю, протівірусні препарати, алкоголь, токсини вірусів Епштейна Барр, гепатиту, токсини іншого походження (22, 24) Зазвичай порушення утворення тромбоцитів (23) відбувається без виснаження кісткового мозку При цьому тромбоцитини, що виробляються у печінці, впливають на всі стадії синтезу тромбоцитів у кістковому мозку (26, 33). Від кількості нормально функціонуючих клітин печінки залежить рівень тромбоцитину (29) Інакше висловлюючись, за кількістю тромбоцитина можна навіть виставити стадію фіброзу печінки (19).

Основна, найголовніша причина тромбоцитопенії?

Коли з'являється і як лікувати первинну тромбоцитопенію у дітей та дорослих?

Як виявити підступний метеоризм у домашніх умовах?

Згідно зі статистикою, до 30% ваших грошей на їжу можуть з'їсти бактерії в кишечнику (40).

А найнебезпечніші для життя газу без запаху! Будь-якої миті може початися серцевий напад (7, 42, 56, 57, 58).

У цьому випадку ви переходите на тестове харчування після самостійного очищення кишечника. І продовжуєте так харчуватись далі до наступної самостійної появи стільця. Якщо ваш кишечник відвик самостійно звільнятися, тоді допоможуть корисні поради (41) лікаря

Будь-яке підсилення здуття живота це небезпека для роботи серця (7, 12, 13), сьогодні

Тромбоцитопенія: основні специфічні ознаки!

Тромбоцитопенія: основні ускладнення!

Основні особливості лікування тромбоцитопенії гормонами?

Більше того, гормони кори надниркових залоз порушують роботу всієї імунної системи. І при хронічному застосуванні гормонів у найближчій перспективі

збільшується небезпека загострення будь-яких інфекцій. А у віддаленій перспективі з'являється підвищений ризик онкології (10, 11)!

Після відміни гормонів донедавна (30, 45, 54, 55) препарати підтримки були відсутні. І часто був рецидив тромбоцитопенії

Буде рецидив тромбоцитопенії після відміни гормонів (30).

Тому рекомендую пройти лікування моїм методом (45, 54, 55) тим пацієнтам, у кого легко виникає рецидив тромбоцитопенії після відміни гормонів

Саме для цього і розроблено рецепт! Зберегти досягнутий на гормонах рівень тромбоцитів та запобігти рецидиву тромбоцитопенії допомагають лікарські трави (30, 45, 54, 55).

Саме тому 20% резистентних до гормонів пацієнтів краще піддаються лікуванню натуральними засобами за моїм методом (8).

Іншими словами, я можу розпочати лікування тромбоцитопенії на фоні застосування гормонів (30, 45, 54, 55).

Основні особливості лікування тромбоцитопенії імуноглобулінами?

Основні особливості лікування тромбоцитопенії при спленомегалії?

Лікування тромбоцитопенії народними засобами в домашніх умовах!

І підвищується ризик загострення супутньої кардіологічної патології (7, 12, 13).

Яка також створює додаткові ризики для життя (42, 56, 57, 58).

Тромбоцитопенія та SARS-CoV-2 інфекція?

Різноманітність штамів коронавірусу завдяки мутаціям дала новий спектр токсинів. Частина токсинів провокує жорсткий окислювальний стрес (20), викликає ураження цитокінами (25) стінок кровоносних судин (31), по яких циркулює кров. А також порушує роботу печінки і нирок (21, 34, 35).

Досить часто, у 14,8-53,1%, при коронавірусній інфекції відбувається підвищення рівня АсАТ, АлАТ, білірубіну. А підвищення рівня ГГТ, що прямо відображає рівень інтоксикації, відбувається у 54% випадків коронавірусної інфекції (35). Ступінь порушень роботи печінки залежить від тяжкості основного процесу (21). А також від здатності токсинів порушувати роботу печінки, стимулювати порушення в системі імунітету або змінювати особливості впливу застосовуваних при лікуванні препаратів (34).

Я свого часу потрапив до цієї категорії. Саме тому тепер переважно вивчаю (18), і правильно використовую (30) роботу печінки. І зберігаю ремісію тромбоцитопенії понад 50 років!

Важливі елементи системи профілактики та лікування тромбоцитопенії ви знайдете у цій книзі. А більше інформації за різної супутньої патології було опубліковано раніше (16, 17, 19). А також важливо знати, як правильно відновити свій організм після кожного випадку захворювання на коронавірусну інфекцію. Щоб запобігти чи скоротити постковідний синдром (9) насамперед необхідно поліпшувати роботу печінки (15, 18).

Тромбоцитопенія та вакцинація?